





سوالات امتحان نهایی درس : حسابان ۲	رشته : ریاضی و فیزیک	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۱۱/۰۴	تعداد صفحه: ۲
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۹ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir			

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱	نمودار تابع $f(x)$ به صورت زیر است. نمودار تابع $g(x) = f(2x - 1)$ رارسم ، دامنه و برد آن را تعیین کنید. 	۱
۲	با رسم نمودار تابع $f(x) = \begin{cases} 1-x^2 & x \leq 1 \\ -1 & x > 1 \end{cases}$ تعیین کنید تابع درجه بازه ای صعودی و درجه بازه ای نزولی می باشد.	۱
۳	چند جمله ای $1 - x^6$ را با عامل $1 - x$ تجزیه کنید.	۱
۴	جای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. دامنه تابع با ضابطه $y = \tan x$ به صورت $\{x \in \mathbb{R} x \neq \dots\}$ است.	۰/۲۵
۵	درست یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید. الف) تابع $f(x)$ در بازه شامل a, b صعودی است. اگر $f(a) \leq f(b)$ آنگاه $f'(a)$ باشد آنگاه $f'(a)$ موجود است. ب) اگر خط $x = a$ مماس قائم بر منحنی تابع $f(x)$ در نقطه $(a, f(a))$ باشد آنگاه $f'(a)$ موجود است.	۱
۶	در شکل نمودار زیر، با تعیین مقادیر ماکریم و می نیم تابع ، ضابطه ی آن را بنویسید. 	۱/۲۵
۷	معادله مثلثاتی $\sin x \cos x = \frac{\sqrt{2}}{4}$ را حل کنید.	۱/۵
۸	حد های زیر را محاسبه کنید. الف) $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{[x] + 1}{x + 1}$ ب) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x - x^3}{3x^2 + 2}$	۱
۹	مجانب های قائم و افقی نمودار تابع $f(x) = \frac{4x^3 + 1}{2x^2 + x}$ را در صورت وجود بیابید.	۱/۵
«ادامه سوالات در صفحه دوم»		

سوالات امتحان نهایی درس : حسابان ۲	رشته : ریاضی و فیزیک	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۱۱/۰۴	تعداد صفحه: ۲
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۹ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir			

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
------	-------------------------	------

۱۰	در نمودار تابع $f(x)$ موارد زیر را مشخص کنید.  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = ? \quad \text{(الف)}$ $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = ? \quad \text{(ب)}$	۰/۵
۱۱	مشتق پذیری تابع $f(x) = \begin{cases} x^3 + 1 & x \geq 1 \\ 2x & x < 1 \end{cases}$ را در نقطه $x = 1$ بررسی کنید.	۱/۵
۱۲	مشتق توابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست). $f(x) = (4x^3 - 7)(2x - 1)^4 \quad \text{(الف)}$ $g(x) = \frac{1 - \sin x}{\cos x} \quad \text{(ب)}$	۲
۱۳	در نمودار $y = f(x)$ شیب نمودار در نقاط A, B و شیب خط AB را از کوچکترین به بزرگترین مرتب کنید. 	۱
۱۴	جسمی از سطح زمین به طور عمودی پرتاب شده است، که معادله ارتفاع آن از سطح زمین به صورت $f(t) = -2t^3 + 10t$ می باشد. سرعت لحظه ای این جسم را در $t = 2$ به دست آورید.	۱
۱۵	مقادیر ماکزیمم و می نیمم مطلق تابع $f(x) = x^3 - 3x + 1$ را در باره $[1, 2]$ تعیین کنید.	۱/۵
۱۶	درستی یا نادرستی عبارت را تعیین کنید. $(f'(x))' = 0 \quad \text{الف)$ در هر نقطه ای که جهت تقری منحنی تابع عوض شود آن نقطه ای عطف تابع است. $f'(c) = 0 \quad \text{ب) اگر } c = x \text{ طول نقطه اکسترمم نسبی تابع } f(x) \text{ و } f'(c) \text{ موجود باشد، آنگاه}$	۱
۱۷	جدول رفتار و نمودار تابع $f(x) = \frac{x}{x-2}$ را رسم کنید.	۲
۲۰	جمع نمره موفق و سربلند باشید.	

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حسابان ۲	رشته: ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۱۱/۰۴		
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال ۱۳۹۹	مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir		
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره	
۱	$D_g = [0, 2] \quad (0 / 25) \quad R_g = [-1, 1] \quad (0 / 25)$ (مشابه مثال صفحه ۱۰) 	۱	
۱	$[-\infty, 0] \cup (1, +\infty) \quad (0 / 25)$ (مشابه کار در کلاس صفحه ۱۸ قسمت ۲) $[0, +\infty] \quad (0 / 25)$ صعودی نژولی 	۲	
۱	$x^5 - 1 = \overbrace{(x-1)}^{(0/25)} \overbrace{(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)}^{(0/75)} \quad (0 / 75)$ (تمرین ۸ قسمت الف صفحه ۲۲)	۳	
۰/۲۵	$x \neq k\pi + \frac{\pi}{2} : k \in \mathbb{Z} \quad (0 / 25)$ (صفحه ۲۲)	۴	
۱	الف) درست (۰/۵) (صفحه ۱۸) ب) نادرست (۰/۵) (صفحه ۱۸)	۵	
۱/۲۵	(مثال صفحه ۲۸ قسمت ب) با توجه به نمودار ضابطه به صورت $b = 3, a = -\frac{1}{2}, y = a \sin bx + c$ می شود. $\max y = \frac{1}{2}, \min y = -\frac{1}{2}, T = \frac{2\pi}{3} \quad (0 / 5) \Rightarrow y = -\frac{1}{2} \sin 3x \quad (0 / 25)$	۶	
۱/۵	$\frac{1}{2} \sin 2x = \frac{\sqrt{2}}{4} \Rightarrow \sin 2x = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin \frac{\pi}{4} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = k\pi + \frac{\pi}{8}, k \in \mathbb{Z} \\ x = k\pi + \frac{3\pi}{8}, k \in \mathbb{Z} \end{array} \right. \quad (0 / 5) \quad (مشابه مثال صفحه ۴۰)$	۷	

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حسابان ۲	رشته: ریاضی و فیزیک ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال ۱۳۹۹ http://aee.medu.ir		مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
------	---------------	------

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

۸	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{3} = +\infty$ (۰/۵) (تمرين ۲ صفحه ۶۹ ق پ)	۱	$\frac{-1}{0^-} = +\infty$ (۰/۵) (مشابه کار در کلاس صفحه ۵۳)
۹	مشابه تمرين ۴ صفحه ۶۹	۱/۵	$2x^r + x = 0$ (۰/۵) $\Rightarrow \begin{cases} x = 0 & (0/25) \\ x = -\frac{1}{2} & (0/25) \end{cases}$ جانب های قائم
۱۰	(صفحه ۴۸)	۰/۵	$y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4x^r + 1}{2x^r + x} = 2 \Rightarrow y = 2$ (۰/۵) جانب افقی
۱۱	مشابه تمرين ۶ صفحه ۱۰۰	۱/۵	$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^r + 1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 2x = 2 = f(1)$ (۰/۲۵) تابع پیوسته است. $f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^r + 1 - 2}{x - 1} = 2$ (۰/۵), $f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x - 2}{x - 1} = 2$ (۰/۵) $\Rightarrow f'_+(1) = f'_-(1) = 2$ تابع در اين نقطه مشتق پذير است. (۰/۲۵)
۱۲	مشابه تمرين ۱۴ صفحه ۱۰۱	۲	(الف) $f'(x) = \underbrace{(12x^r)(2x - 1)^4}_{(0/5)} + \underbrace{4(2x - 1)^3(2)(4x^r - 7)}_{(0/5)}$ (ب) $g'(x) = \frac{\overbrace{-\cos x (\cos x) - (-\sin x)(1 - \sin x)}^{(0/25)}}{\overbrace{\cos^r x}^{(0/25)}}$ (مشابه کار در کلاس صفحه ۹۶)
۱۳	مشابه تمرين ۷ صفحه ۸۲	۱	$\underbrace{m_A}_{(0/25)} < \underbrace{m_{AB}}_{(0/5)} = 0 < \underbrace{m_B}_{(0/25)}$

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حسابان ۲	رشته: ریاضی و فیزیک ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه																	
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۱۱/۰۴																	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال ۱۳۹۹ http://aee.medu.ir		مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی																	
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره																	
۱۴	$f'(t) = \underbrace{-4t + 10}_{(0/5)} \Rightarrow f'(2) = \underbrace{-8 + 10}_{(0/5)} = 2$ (مشابه مثال صفحه ۱۰۷)	۱																	
۱۵	$f'(x) = \underbrace{3x^2 - 3}_{(0/5)} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$ (مشابه تمرین ۶ صفحه ۱۲۵) $\underbrace{f(1) = -1 \quad f(-1) = 3 \quad f(2) = 3}_{(0/5)} \Rightarrow \begin{cases} \max f(x) = 3 & (0/25) \\ \min f(x) = -1 & (0/25) \end{cases}$	۱/۵																	
۱۶	الف) نادرست (۰/۵) (تمرین ۱ صفحه ۱۳۶) (صفحه ۱۱۶) (۰/۵) ب) درست (۰/۵)	۱																	
۱۷	رسم شکل (۰/۵) (مشابه تمرین ۱ صفحه ۱۴۴) $x = 2$ مجانب قائم ($0/25$) $y = 1$ مجانب افقی ($0/25$) $y' = \frac{-2}{\underbrace{(x-2)^2}_{(0/25)}} < 0$ ($0/25$) رسم جدول ($0/5$) <table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f'(x)$</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>$+\infty$</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	0	2	3	$+\infty$	$f'(x)$	-	-	-	-	$f(x)$	1	0	$+\infty$	3	1	۲
x	$-\infty$	0	2	3	$+\infty$														
$f'(x)$	-	-	-	-															
$f(x)$	1	0	$+\infty$	3	1														
۲۰	جمع بارم																		